

## 胆道がん

| レジメン名称   | 商品名    | 一般名    | 投与量                    | 投与時間     | 投与日     | 1クール |
|----------|--------|--------|------------------------|----------|---------|------|
| GEM+CDDP | ゲムシタビン | ゲムシタビン | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 30分 | d1,8    | 21日  |
|          | シスプラチン | シスプラチン | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 1時間 | d1,8    |      |
| GEM単剤    | ゲムシタビン | ゲムシタビン | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 30分 | d1,8,15 | 28日  |

## 膵臓がん

| レジメン名称     | 商品名      | 一般名                    | 投与量                       | 投与時間      | 投与日     | 1クール |
|------------|----------|------------------------|---------------------------|-----------|---------|------|
| GEM+nabPTX | アブラキサソ   | パクリタキセル(アルブミン懸濁型)      | 125 mg/m <sup>2</sup>     | 点滴静注 30分  | d1,8,15 | 28日  |
|            | ジェムザール   | ゲムシタビン                 | 1000 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴静注 30分  | d1,8,15 |      |
| FOLFIRINOX | エルプラット   | オキサリプラチン               | 85 mg/m <sup>2</sup>      | 点滴静注 2時間  | d1      | 14日  |
|            | イリノテカン   | イリノテカン                 | 180 mg/m <sup>2</sup>     | 点滴静注 90分  | d1      |      |
|            | レボホリナート  | レボホリナートCa              | 200 mg/m <sup>2</sup>     | 点滴静注 2時間  | d1      |      |
|            | フルオロウラシル | 5-フルオロウラシル             | 400 mg/m <sup>2</sup>     | 急速静注      | d1      |      |
|            | フルオロウラシル | 5-フルオロウラシル             | 2400 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴静注 46時間 | d1      |      |
| GEM単剤      | ゲムシタビン   | ゲムシタビン                 | 1000 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴静注 30分  | d1,8,15 | 28日  |
| S1+GEM     | ジェムザール   | ゲムシタビン                 | 1000 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴静注 30分  | d1,8    | 21日  |
|            | ティーエスワン  | テガフル<br>ギメラシル<br>オテラシル | 80 mg/m <sup>2</sup> /day | 1日2回 朝夕食後 | d1-14   |      |
| GEM+TAR    | ジェムザール   | ゲムシタビン                 | 1000 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴静注 30分  | d1,8,15 | 28日  |
|            | タルセバ     | エルロチニブ                 | 100 mg/body/day           | 1日1回空腹時   | d1-28   |      |